II. Georg. Joſeph. Camel. *De Plantis* Philippenſibus *Scandentibus*; *Pars 2da. Ad* Jacobum Petiver, *S. R. S. nuper tranſmiſſa.*

Sect. V. *De* Scandentibus *Folliculoſo-Siliquoſis.*

61. APocynum LUZONIS 1, *ſeu* Antipolanum. *Indis* Balana. Fructum fert formæ & magnitudinis habitioris *Mangæ*, ſpithameum, viridem, copioſiſſimè lacteſcentem, lacte candidiſſimo, ſpiſſo, nec viſcoſo. *Semen* compreſſum, magnitudine unguis digiti indicis, creberrimum, in oblongum glomum imbricatim congeſtum, flaveſcens, & unciâ longioribus, argenteis, & ſericeis caudatum floccellis. Ex altiſſima dejectum arbore habui Fructum. *Florem* & *Folia* obſervare non licuit.

62. Apocynum LUZON. alterum. Indis *Tugtungajas*, i. e. *Viperinum*, eò quod eo Serpentes virides ſpecialiter gaudeant; *Folia* gerit ſibi oppoſita, ferme palmaria, ſimilia foliis *Hingio*; *Fructum* orbicularem *Aurantio* parem latere uno fere digitum latâ criſtâ alatum, ex viridi & albo variegatum, edulem cum tener, uniforem ubi criſtatus, qui glomum continet *Seminis*, ſimilis ſemini *Balana* ſuper ſpongioſam matricem conglobati, in auras avolantis.

63. Apocynum LUZON. 3. Maycatenſe, *Viticulis* ſcandit creberrimis, vietis, geniculatis, lacteſcentibus. *Folia* promit *Hingio* ſimilia, *Tugtungajas* majora, ex viridi pallentia, *Florem* frequentem, pentapetalum, radiatim in binum corymbum, ceu umbellam congeſtum, graveolentem, flaventem. *Fructum* quadrangularem, tetraforem, viridem, ſpithameum, in mucronem deſinentem, continentem

The Royal Society is collaborating with JSTOR to digitize, preserve, and extend access to *Philosophical Transactions (1683-1775).* www.jstor.org

nentem *Semen* ſquammatim congeſtum, lacinioſculum, ſimile Semini *Balana*, ſed protenſioribus, argenteis, & pappoſis filamentis, *Cometæ* adinſtar caudatum.

Fig. 64. Apocynum LUZON. 4. Maragondonenſe. *Indis* Dugtungajhas i. e. *Colubrinum*. Hiſpan. *Palo conſuelda de la culebra*, alijs *Palo de la caveza*. Minimè autem *Ligni Colubrini* nomen adeptum eſt, quod Viperarum ſuccurrat morſibus ut *Manungal*, ſed quod Serpentes vulneratos hujus Plantæ folijs ſibi mederi obſervatum fuerit, unde *Indi* edocti, & folijs & lignoſorum ſarmentorum, quæ fere brachialia, ſcobe, ad conglutinanda vulnera recentia proſperrime utuntur. Hujus convolvuli lignoſi, ſarmenti materie albet, poroſa eſt & ſpongioſa, levis & inſipida. *Cortex* craſſus, ſtriatus, fiſſuris plurimis diductus, ſaporis ſubadſtringentis, *Liber* interior tenax & corticoſus. *Folia* ſibi oppoſita; villoſa, *Laurinis* latiora; *Radix* ſubdulcis: *Folliculi* fructus ex ſubrotundo ventre in teretem & ferme ſpithameum abeunt mucronem, *Semine* referti mediocri, ut reliquæ *Apocynorum* ſpecies.

Fig. 65. Apocynum LUZON. 5. *Taytayenſe*. Indis *Hingi guag*, i. e. *Hingi Corvinum*. Pro *Flore* dat candidas ſtellas, odoris *Jaſmini*, in ramuſculorum ſummitatibus exeuntes, quibus ſuccedunt *Siliquæ* compreſſæ, ſcabie variegatæ, digito auriculari tenuiores, ſed ſæpius pedes duos longiores, pullæ, & ſemine pappo coronato repletæ: *Folia* pulchella, lætè virentia, ſena communiter uno in ramuſculo. Ipſa planta Fruticoſa eſt, longis flexibilibus, & lacte glutinoſo ſcatentibus virgultis ſcandens, & alijs ſuperſterni gaudens.

66. Apocynum LUZON. 6. ſeu *Hingiguag* Antipolanum. *Folia* communiter 4, opaceè virentia, palmum longa, ſeſquiunciam lata, uno gerit in ramuſculo, ex quorum apicibus ex frequentibus ramulis, creberrimi *Flores* in *Siliquas* 12 aut 15 ſpithameis, ſenis aut pluribus orbicularibus ventribus gratioſè extuberantes, abeuntes: *Semen* parvum, appenſo pappo ut quinti. Tota Planta uberrimè viſcoſo gaudet lacte.

67. Apo-

67. Apocynum LUZON. 7. ſeu *Piſcatorium* fluvij *Ma-* Fig.
nilenſis 1. Gratioſa & ſcandens eſt Planta, *Folia* emittit bina ac bina, uno longiori inhærentia pediculo, rarò palmum longa, communiter uncialia & ſeſquiuncialia, nigro virentia, terſa, quæ maſticata primùm adverſi ſunt ſaporis, mox fauces potenter acredine vellicant. Contuſa cum alijs piſcationi deſerviunt medicæ. Ex medio connexionis foliorum, flagellum in ſummo triſidum, in foliola minima abiens procedit. Ad apices verò, uti & ad foliorum alas plures proveniunt *Floſculi*, qui ex 12 viridibus, craſſis, teretibus ſeu cylindricis componuntur *foliolis*, quorum umbilicum, flaveſcens globulus, ex minimis compilatus ſtaminibus, occupat; floſculi *Roſarum* mixtum *Cinamomi* ſuaviſſime reſpirant odorem. *Siliquæ* puſillæ ex tereti mucronatæ, unifores 12 aut pauciores in unum quaſi congeſti corymbum, *Semen* habentes parvum, oblongum. Provenit ubertim ad fluvii *Manilenſis* ripas a Horto *D. Quintero* villa *S. Petri* uſque. *Indi* Itmoitmohan *vocant*. Folijs contuſis utiliter perfricant *Lepam Caſcado*; ſuccus illitus tumefacit.

Fig. 68. Apocynum LUZON. 8. ſeu *Malatenſe*. *Folia* Fig.
habet ſibi oppoſita, ſeſquiuncià longiora, ex rotundo oblonga, atrè virentia, in vietis & teretibus viticulis: *Florum* muſcoſorum, ramoſi & ſpithamei racemi una cum caulículis ex atro purpurei ſunt. Seminis *Siliquæ* ſeſquiunciales, vix calamum ſcriptorium craſſæ, virides, ex tereti mucronatæ. *Semen* parvum, latiuſculum, niveâ comatum cæſarie.

69. Apocynum LUZON. 9. *Viticulis* attollitur ſcanden- Fig.
do teretibus copioſè lacteſcentibus & helvâ lanugine pubeſcentibus. *Folium* eſt hederaceum, amplius palmo unô, longum ſeſquipalmum, ſibi oppoſitum, per palmaria intervalla exiens, ſubaſperum: *Flos* parvus, pentapetalus, phæniceus, racematim cohærens. *Fructus* bini, ac bini, fere ſeſquipalmares, calamum Anſerinum craſſi, unifores, & ſubhirſuti

hirſuti lobuli. *Semen* longiuſculum, comatum floccellis ut reliquorum.

Fig. 70. Apocynum LUZON 10. *Indis* Dugtungaſas ut 2 & 4. *Folia* promit per ſeſquipalmaria intervalla bijuga, unâ cum pediculo ſpithamea, palmo latiora, glabra, & craſſiuſcula. *Flos* congeritur ad foliorum genicula ter trinus, aut crebrior, parvus, viridis, ſtellatus, cui ſeminis ſuccreſcunt *Siliquæ* palmares, aut longiores, quaſi ex binis calamo ſcriptorio craſſis in unam coaleſcentes, ſeu in ipſa conjunctura carinulatæ & fiſſiles. *Semen* viride, longiuſculum, compreſſum, argenteo caudatum pappo.

Fig. 71. Apocynum LUZON. 11. *ſeu* Silanenſe. *Cauliculis* ſcandit rotundis; *Folijs* luxuriat pulchris, ſibi ex adverſo provenientibus, ſuccoſis craſſioribus, nervis ceu altius proſtantibus porcis concinnè exaratis, mucronatis, bipalmum longis, palmum latis. *Flos* ad foliorum exiens ſinus, in longiori pediculo, duodenus, in corymbum diſpoſitus, & majuſculus, eſtque monopetalus ceu campana, flaveſcens infernè ad plicas purpuraſcens, cujus labia quinis ſiſcuris hiatibus, in unum interim coactis, aut coaleſcentibus ſuperné marginibus. *Fructum* non obſervavi, *Lanigerum* ſuppono.

Fig. 72. Apocynum LUZON. 12. Macatenſe. *Folia* communiter 4 in uno ramuſculo, ex quorum apice *Flores* 5 aut 7. albi, ſtellati, mediocres, ad medium ut Flores *Borraginis* nigris ſtaminibus umbilicati.

Fig. 73. Apocynum LUZON. 13. Indis *Tibalau* ſeu *Piſcatorium* ſecundum. Scandens eſt Planta & lacteſcens, ut reliquæ. *Folia* mittit communiter 9 uno in ramuſculo, & hæc fere ſpithamea, uncias 2 lata, in mucrone deſinentia & nervis a medio in marginem rectè excurrentibus, & è regione oppoſitis exarata. Lenta, tractu contumacia, & lacteſcentia ſarmenta, piſcationi deſerviunt medicæ, cum folijs *ſeptimi*, *Camaeſæ*, & *Lactang fructu*, *Banulad*, *Burao*, *Tigao*, *Tuble* & *Culiſao*, &c. *Tibalau* vel *Tabal* lac venenatorum animalium morſibus medetur.

74. Apo-

74. Apocynum LUZON. 14. Indis *Hingi*, *Hingib* & *Hingio*. Eſt unum ex magis uſualibus *Liguſtris*, cujus lenta, vieta & fractu reſiſtentia ſarmenta ad quævis occurrentia liganda deſerviunt. Volubilis eſt Planta, ſcandens, lacteſcens, magna, *folio* ſibi oppoſito, ſeſquipalmari, palmaris latitudinis, ſimili *Aſclepiadis* folio. Pro *Fructu* ſiliquæ lanigeræ. Fig.

75. Apocynum LUZON. 15. *Seu* Liguſtrum *Indorum* è celebrioribus 2, eſt *Bagungbung*, Calvigenſibus *Bacungbacung*, alijs *Hacnaiag*. Hujus *Sarmenta* precipuè expetuntur & adhibentur ad anfractuoſas, & labyrinthæas ſepes, ex *Cannis* paratas, deligandas, quoniam ſubmarina quaſi perennant, quas per maris littoralia longiùs excurrentes diſponunt ad *Piſces* fallendos. *Lac* internè exhibitum prægnantibus Abortum cauſat. *Liguſtris* adnumera & *Camagſa*, *Togtalag*, & *Sagacag*.

76. *Tubre*, *Tugle*, vel *Tugli* aut *Tuble*, aliis *Caſſli* Boholauis *ſcilicet*, Tanaguanenſibus *Topoc*. Ni fallor ſpecies eſt *Apocyni*, pro *Fructu* etenim mittit *Siliquas*, *ſemine* ſericeâ lanugine impletas. *Volvulus* eſt lacteſcens, piſcationi deſerviens medicæ, ſuâ acrimoniâ moleſtat ut *Radix* Camaæſæ, *Euphorbij* ſcilicet modo: *Lac* Oculis inſperſum excæcat. *Byſaiarum* Indi Sarmenta, quæ fere ſunt brachialia, ſuo adjiciunt oleo Polycreſto, *Haplas*.

77. *Tubre* vel *Tugle* altera. *Folia* fert compoſita, com- Fig.
muniter ex alijs 7, alternè provenientia: Particularia verò conjugatim, claudente ſeptimo ſeriem, ſunt autem ſeſquiunciam lata, palmum, ſeſquipalmum, & ampliùs longa.

78. *Tuguituguian* deobſtruens eſt, & inſignis vulneraria.

79. Apocynum LUZON. 17. Seu *Arboribus* tantùm in- Fig.
naſcens 1. *Indis* Capalcapal. *Viſci* modo *Cannis*, & Arboribus vetuſtioribus, aut putridis innaſci ſolet. *Folia* communiter habet palmaria, digitum lata, obtuſa, craſſa ut *Sempervivum*, & his craſſiora, lævia, & copioſè lacteſcentia, ex oppoſito exeuntia, in teretibus viticulis, imo nonnunquam in plantâ luxuriante vitioſè folia palmum unum, aut ſeſquipalmum lata, & ſpithamæ magis, aut minus longa. *Floſculus* binus ac binus exit ad foliorum angulos, puſillus,

& candidus. *Semen* parvum plumosâ cæsarie ornatum, in trigonis & folliculosis siliquis.

80. Apocynum LUZON. 18. seu *Arboribus* innascens alterum. s. *Antipolanum*. *Folia* exerit unà cum pediculo spithamea, uncias trinas lata, crassiuscula, 4 fere uno in ramulo, lacteiscentia. Planta tota lacteiscit, nec scandit ut reliquæ *Apocyni* species, sed quasi arboribus inserta, in aliquot abit ramos, quorum apices in florigeram definunt umbellam ex 11 pluribus aut paucioribus floisculis constantem, qui formæ florum *Borraginis* sunt, candidæ scilicet & pentapetalæ stellulæ, pallido limitatæ auro, uti & hamatâ umbicatæ coronâ. *Fructum* non vidi.

Fig. 81. Apocynum LUZON. 19. seu *Arboribus* innascens 3. Variè serpendo per arborum caudices, *radices* ijsdem insertas agit sat crassas, & lignosas. *Folia* formæ foliorum *Phyllitidis*, crassa, exsucca, tersa, nervis carentia, excepto medium secante. *Flos* ex tubulo pentapetalus, coloris cinnabarini, in gratiosam congestus umbellam, trinus semper ex uno pendet calyculo, & crocatis staminibus repletur.

Fig. 83. Apocynum LUZON. 20. *Ligustri* loco deservit *Indis*. *Folium* subrotundum, hederaceum, succosum, suave, conjugatum, splendens. *Flos* frequens in umbellâ, virens, pentapetalus, rotundifolius, inodorus. *Sarmenta* tenacissima & lenta.

Sect. VI. Scandentes *Baccifera* folio *bijugo*.

Fig 83. *Periploca* 1. legitima & usualis. *Candotay vel* Candotan *Indis*. Yerba del pedo & Yerba de la mierda *Hispanis*. Rependo & scandendo quæque vicina amplectitur, quibus sese involvendo arctissimè innectitur. *Folia* habet *Asclepiadis*, e regione opposita, palmaria, non lacteiscunt. *Flores*, in 4 e foliorum geniculis prodeuntibus, semper ter trinè ramosis & longioribus pediculis 3 creberrimi, gratiosissimi, ex niveo purpurascentes, campanulati, c. oris crenatis, racematim congeruntur, quibus *Fructus* orbiculares, primùm virides, maturi rubentes, coronati, *Piso* compares

succe-

ſuccedunt, *ſemine* referti. *Folia* ſtercus fœtidiſſimum olent, hinc *Stercerariam* vocant. Decoctum laudatur in Uſus Urinæ retentione, Vertigine, Febribus, & ad caſum ex alto, ad diſſolvendos ſcilicet ſanguinis concreti grumos, potum: Alij in enemate ad flatus diſcutiendos commendant. Alij in Urinæ retentione exinde balnea parant vaporoſa, magma pubi imponendo. *Wilhelmus ten Rhyne* Folia Stercoriaria & *Foelo do Pedo* vocat, & ad Lepram commendat.

84. *Periploca* ſeu *Candotay* altera. *Folijs* gaudet ſubro- Fig.
tundis, bijugis, palmaribus: *Flores* albi, ſtellati, in ramoſâ, ſeu ſemper in binos ſubdiviſâ ramulos, quaſi umbellâ. *Fructus* eſt bacca, mucronata, *Piſo* ſuppar, 5 folio caliculo.

85. *Periploca* s. Candotay 3. *Lianenſis*. Volvulus eſt Fig.
lacteſcens, folij ſociati, anguſti, ſeſquipalmaris, unciam lati, craſſiuſculi, & ſubhirſuti. *Viticula* compreſſa ſunt, ſtriata, vieta, ſubhirſuta. *Uſus* foliorum ad flatus pellendos.

86. *Periploca* s. Candotay 4. Similis eſt 3, ſed *folio* Fig.
hederaceo, palmum lato, & ſeſquipalmum longo, ex adverſo appenſo. *Radice* exiguâ, glumoſâ, s. grumoſâ, inæquali, & verrucoſâ, ut *Radix Scrophulariæ*.

87. Coliyat. *Volvulus* eſt maximus, *Prunifer*; *Folia* ferens, Fig.
ſibi oppoſita, ſpithamea, ferme ſeſquipalmum lata. *Fructum* promit copioſiſſimum, in maximis racemis, binum ac binum ab uno pediculo hærentem, magnitudinis *ovi Columbini*, aut majorem, ex flavo rubentem, carnoſum, continentem *nucleum* formæ & magnitudinis glandis *Quercinæ*, edulem, ſaporis *Caſtaneæ*, ſi igne coctus fuerit. Abundat in montibus *Antipolo* & *Paynam*.

88. Smilax LUZON. aſper major, *Indis* Malaitmo. *Con-* Fig
volvulus eſt magnus, *folio* rigido, nervoſo, & *Malabathri* folio majori, trinervio, & ſociato. *Fructus* ſunt acini, *Ceraſo* majores, lutei, carnoſi, amari, & in botrum congeſti, continentes binos, compreſſos, corneos, amaricantes, & aſperâ ac albâ cuticulâ intectos arillos.

89. Smilax LUZON. aſper alter. *Manambuc*, *Panamboc*, & *Yſipaſſin* Indis. *Volvulus* eſt cujus *Sarmenta* trium ſunt unciarum in diametro communiter, verò ferme verrucoſa ſunt, & craſſa, ut *Macabuhay*, & ſimiliter ſenectas deponunt, & exeunt Serpentum modo, ut illius. *Folium* nonniſi probè maſticatum, leviter morſicat, hederaceum eſt, *Betele* folio fere ſimile, ſed tenerum, & molle, alternè exiens, trinervium; *Fructus* ſunt oblongi, *Avellanâ* minores, virides, mox lutei, tandem corallini acini, in racemum cohærentes, & bini, aut trini ex uno pediculo: Mucagine, & unico, duriuſculo, aſpero, cujus medulla amara eſt, *oſſiculo* referti. Flos albus eſt, parvus, tripetalus in triungui calyce. *Radix* deforis flaveſcit, cortice eſt craſſo, & carnoſo, ut *Zarzaparilla*, & ut hæc longiſſimè prorepit, craſſa digitum, recenter eruta, & deguſtata ex levi amaritudine dulceſcit, mox acredine moleſtat.

Sect. VII. Scandentes *Bacciferæ* trifoliæ.

90. *Clematis* trifolia vulgaris. *Calitcalit*, *Gavilan* & *Panopol* Indis. *Folio* crenato, obſcurè virenti, & parte alterâ ſubhirſuto, & communiter trino alternè e viticulis prodeunte, vicinis ſuperinſternitur, & irretitur. *Flores* quadrifolij ſunt, & herbacei. Quibus *Baccæ* primùm virides, mox nigræ, ſucco morello plenæ, trinæ, ac trinæ cohærendo in corymbum ſuccedunt. Vulneraria, & conſolidans eſt, cujus folijs contuſis, & ſub cinere coctis, ſuccoque expreſſo, vulgus, & ad emollienda *Ulcera*, & ad mundificanda & conſolidanda rupta, & fracta, extirpandas *Lichenes*, & detergendam *Scabiem* utitur.

Fig. 91. *Clematis* incana. *Calitcalit maybula* Indis. Similis eſt vulgari, ſed ad tactum tota ſuavis, ob molliuſculum pilum, quo tota planta incaneſcit.

92. *Clematis* monſtruoſa, ſeu *Calitcalit* maxima. *Folia* gerit heptaphylla, glabra, & lætè virentia, majora quam ſint *Clematidis acetoſæ*: Flagella *ſeſquicubitalia*; Sarmenta *Vitis Viniferæ* ſimilia, brachium craſſa; *Acinos* in corymbo, ut *Clematis vulgaris*.

93. *Oxyclematis*

93. *Oxyclematis* trifolia. *Calitcalit maſuca, Aiyo* Indis. Fig. Similis eſt priori, ſed *folijs* majoribus, quæ & pentaphylla evadunt, profundiùs inciſis, copioſiori, & acetoſo ſucco turgentibus, ad quorum nexus longiores protuberant *capreoli*, quibus fulcitur ſeſe innectendo. *Flores* quaſi in umbellâ, flaveſcentes, tetra-aut pentapetali, quorum umbilicum calyculus ventricoſus occupat. *Flores* in acinos abeunt, ut prioris, ſed majores. Planta vulneraria eſt & febrifuga.

94. Clematis *LUZON.* 3. ſeu Major, ſive *Vitis* ſylveſtris. Fig. *Indis* Bica & Malauva. *Planta* eſt ſcandens, trifolia, in quibuſdam *Viti Sylveſtri viniferæ* ſimilis, piloſa. *Folia* ſubrotunde crenata, ſeſquì palmum & longa & lata. *Botros* fert Magnos, *acinos* habiliores, aſperos, ſubdulces, nigros aut etiam incarnatos ut *Silanij* vidi, fœtentes.

Sect. VIII. Scandentes *Bacciferæ*, folio alterno.

95. Vitis Sylveſtris *LUZON.* altera. *Bulacan* s. *Buracan limbahon*, i. e. folij rubri *Guiganenſibus*. an *Altragena* Theophraſti? *Volubilis*, ſcandens, & lacteſcens eſt planta, inter ſaxa ad fluviorum Margines provenire gaudens. *Sarmentis* eſt viticeis, rubris, quandoque dodrantem craſſis, *Foliis* Vitis vix non ſimilibus, infernè ſubhirſutis. Utuntur ex reciſo longiori ſarmento, aquoſo, & inſipido lacte, ad ¾ pro doſi propinando, quod ſuaviſſimè & ſine ullâ moleſtia alvum ſubducit. Alij nihilominus alvum potenter deturbare ferunt, unde in colicâ, & animalium venenatorum morſibus commendant, imo & in paucâ quantitate exhibitum abortum cauſare, & fœtum mortuum expellere affirmant. *An* Bexucus *Peruanus* purgans *Godofredi le Brun?* quem *C. Cluſius* Atragenæ *Theophraſti* ſarmenta eſſe ſuſpicatur.

96. Bulacan *foliorum viridium*, ob vehementiam quâ operatur in uſum non venit; hujus ni fallor erunt effectus, fœtum pellere, & alia, quæ ſupra.

97. Vitis *LUZON.* ſylv. 3. *Ottonienſis*, Spontanea eſt Fig. & *Corinthiacæ* æmula. *Pampini* vix palmares, trilobati, *floſculi*

floſculi herbacès, pentapetali, *Uvæ* ut *Corinthiacæ*, in parvis racemis quaſi in umbellâ.

Fig. 98. Alanguilang *ſcandens*, ſeu Hinlalagac. *Volvulus* eſt *fructûs* Roſei, acido-dulcis, tantillum piloſi, racemo appenſi. *Mariquinæ* exit.

Fig. 99. *Vitis Ulceraria*, Alexandri. *Planta* eſt ſcandens: *Folia* hederacea, trinervia, crenata, ſplendicantia, ſequipalmaria, quæ deguſtata quidpiam acidi ſapiunt, mox fauces morſicando vehementer exaſperant. *Flores* parvi, albi, tetrapetali. *Baccæ* Magnitudinis Piperis & majores, in acumen abientes, ex adverſo foliorum racematim propendent. Magni æſtimant hanc plantam *Indi*, qui foliis contuſis emplaſtri modo in Ulceribus putridis, antiquis, manantibus, ſordidis, ſchirrhoſis, calloſis, fiſtuloſis & cancroſis utuntur, præcipuè verò in Ulceribus ſaucium in collutione. Abſceſſus præterea, & Apoſtemata emollit, & rumpit, ut *Alypaioxg.*

Fig. 100. *Viticella*, Balagundugut *Indorum*. Perpuſillus, elegans, & gratioſſimus eſt *Volvulus*; folia incana, quinque-nervia, alterna, corda effingentia; *Floſculi* minimi, albidi, muſcoſi, quaſi in corymbum coeunt; *Baccæ* lætè rubentes, qualia Sardois hærent Corallia ſaxis, piſo minores, foliorum congeriei imbricatim immixtæ, pulchellos concinnant racemulos.

Fig. 101. Malabanag. *Scandens* eſt Planta, habens *folia*, 5 nervia, alterna, ſimilia *Banag*, i. e. *Pſeudochinæ*, ex adverſo foliorum umbellæ *Florum*, inodorum, ex viridi flaveſcentium, hexaphyllorum, quibus *Baccæ* rubræ, parvæ, inſipidæ, lento glutine turgidæ, Piperi pares ſuccedunt. *Semen* parvus eſt *Phaſeolus*.

Fig. 102. Coccus volubilis, *Indis* Lobato, Libato, & Bredotali: *Hortenſis* & duplex montanus, *Naicenſis* & *Maiſlamus*. Hortenſis *Planta* eſt ſcandens, ſuccoſa, veſca, tenera, amans umbroſa & uda. *Viticuli* craſſi, teretes. *Folia* carnoſa, ampla, fere ſphærica, in mucronem vergentia, flaveſcentia, terſa, & nervis expertia, alternè appenſa. In ſummitatibus ramuſculorum e regione foliorum unciales, aut ſeſquiunciales

ciales racemuli, ſeſſilibus, coccineis, piſo paribus, ſuccoque chermeſino exuberantibus *baccis* onuſti, ſaporis nullius manifeſti. *Semen* orbiculare Coriandro minus. *Floſculi* calyculati, erubeſcentes. *Radix* coloris nativi, ſuccoſa, nodoſa, verrucoſa, & *ſcrophulariæ* modo multifariè inæqualis, & divaricata. Succum *Indi* ad caloris æſtum in Febribus attemperandum propinant. Veſcuntur folijs decoctis, & in acetarijs crudis. Ex *Baccis* ſyrupum paravi coloris coccinei, ad Julepos Febricitantium pulchro imbuendos colore perutilem.

103. *Coccus volubilis ſylveſtris.* Pariter edulis eſt; *Folia* tenera, ſucculenta ut *Portulacæ*, terſa, priori majora, ex atro virentia. *Folia* ſuppurationem adjuvant adimpoſita; Decoctum alvum emollet.

104. Cubebæ *Officinarum.* Plantam *Indi* Naple, Dalihupa & Buyonibun, i. e. *Betele Corvinum*, vocant. Hæc non ut *Betele* ſeu *Itmo*, *Mala-Itmo*, *Litlit* ac *Sabia* alijs inhærendo ſcandit, ſed vicinis ſeſe acclinando, ac ſuperinſternendo luxuriat, eſtque Planta amans umbroſa, crebrò ramoſa, *ramis* ſolidiuſculis, geniculatis nec vietis, ut reliquæ *Piperis* ſpecies, *folijs* obſcurè virentibus, parvis communiter, ſeſquiuncialibus, quinis fulcitis nervis, aromaticis. *Fructus* qui racematim propendet, maturus coloris eſt incarnati, *Semen* habens album, orbiculare, acriuſcule, aromaticum. Hæ *Baccæ* cum *Cluſij* deſcriptione collatæ, *legitimæ* ſunt *Cubebæ Officinarum.* Racemuli ſunt ſeſquipalmares.

105. *Piper* nigrum. *Hederæ* modo arboribus irrependo, & geniculis Sarmentorum (quæ brachio craſſiora) radiculas emittendo, & ſpecialiter Arbori *Dapdæ* (ob molliuſculum & ſuccoſum corticem) innaſci gaudet & vitioſè luxuriat. Creſcit in *Leyte*, *Otton*, *Panay* & *Mindanao.* *Fructus* in racemis, acini maturi rubent. Piper *nigrum* ſunt acini virides collecti: *Album* ſunt acini maturi collecti, ſed unius plantæ fructus.